

# NOTICE

## Dénomination du médicament

**TEATROIS 0,35 mg, comprimé**  
**Tiratricol**

## Encadré

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament** car elle contient des informations importantes pour vous.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez toute autre question, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.

· Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Voir rubrique 4. [Sommaire notice](#)

## Dans cette notice :

1. QU'EST-CE QUE TEATROIS 0,35 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?
2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TEATROIS 0,35 mg, comprimé ?
3. COMMENT PRENDRE TEATROIS 0,35 mg, comprimé ?
4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?
5. COMMENT CONSERVER TEATROIS 0,35 mg, comprimé ?
6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

## 1. QU'EST-CE QUE TEATROIS 0,35 mg, comprimé ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISE ?

### Classe pharmacothérapeutique

HORMONES THYROIDIENNES  
(H: Hormones - sauf sexuelles)

### Indications thérapeutiques

Ce médicament est utilisé pour freiner la sécrétion de TSH (hormone stimulant le fonctionnement de la glande thyroïde).

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE TEATROIS 0,35 mg, comprimé ?

### Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament

Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

### Contre-indications

**Ne prenez jamais TEATROIS 0,35 mg, comprimé dans les cas suivants:**

- en cas de maladie, cardiaque,
- en cas d'insuffisance coronaire,
- en cas de troubles du rythme cardiaque: (accélération du rythme cardiaque, fibrillation auriculaire, flutter),
- en cas d'hyperanxiété,
- en cas d'hyperthyroïdie (augmentation de la sécrétion des hormones thyroïdiennes).

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

### Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales

**Faites attention avec TEATROIS 0,35 mg, comprimé:**

#### Mises en garde spéciales

Ne pas utiliser ce médicament comme traitement de l'obésité, sauf en cas de maladie de la thyroïde.

Ce médicament contient du lactose. L'utilisation de ce médicament est déconseillée chez les patients présentant une intolérance au galactose, un déficit en lactase de Lapp ou un syndrome de malabsorption du glucose ou du galactose (maladies héréditaires rares).

## **Précautions d'emploi**

Prévenir votre médecin, en cas de diabète, d'hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires anciennes.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN

### [Interactions avec d'autres médicaments](#)

#### **Prise d'autres médicaments**

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, et notamment un anticoagulant, un antiépileptique, de la chloroquine ou du proguanil (médicaments contre le paludisme), des estrogènes non contraceptifs (pour le traitement de la ménopause), de la rifabutine ou de la rifampicine (antibiotiques), du sucralfate (antiulcéreux), de la colestyramine (médicament abaissant le cholestérol), de la cationésine sulfosodique (médicament abaissant le potassium), du calcium, du fer, des pansements gastriques, des antiacides, du charbon, du sévélamer (médicament abaissant le phosphate dans le sang) ou de l'orlistat (médicament utilisé dans le traitement de l'obésité et du surpoids), parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

### [Interactions avec les aliments et les boissons](#)

Sans objet.

### [Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives](#)

Sans objet.

### [Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement](#)

#### **Grossesse et allaitement**

Compte tenu des données disponibles, l'utilisation de TEATROIS doit être réservée à des indications strictement limitées.

TEATROIS est déconseillé pendant l'allaitement.

### [Sportifs](#)

Sans objet.

### [Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines](#)

Sans objet.

### [Liste des excipients à effet notoire](#)

#### **Informations importantes concernant certains composants de TEATROIS 0,35 mg, comprimé:**

**Liste des excipients à effet notoire:** lactose.

#### **3. COMMENT PRENDRE TEATROIS 0,35 mg, comprimé ?**

### [Instructions pour un bon usage](#)

Sans objet.

### [Posologie, Mode et/ou voie\(s\) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement](#)

#### **Posologie**

2 à 5 comprimés par jour, répartis en 3 ou 4 prises dans la journée.

Respectez les recommandations de votre médecin.

#### **Mode et voie d'administration**

VOIE ORALE

Il est recommandé d'avaler les comprimés avec une quantité suffisante d'eau et d'éviter de prendre votre médicament en position couchée.

### [Symptômes et instructions en cas de surdosage](#)

#### **Si vous avez pris plus de TEATROIS 0,35 mg, comprimé que vous n'auriez dû:**

Contactez immédiatement votre médecin traitant.

### [Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses](#)

Sans objet.

### [Risque de syndrome de sevrage](#)

Sans objet.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?

##### Description des effets indésirables

Comme tous les médicaments, TEATROIS 0,35 mg, comprimé est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Peuvent être observés: une accélération des battements cardiaques, une hypernervosité, une augmentation de la température, des sueurs plus abondantes, des troubles du sommeil, un amaigrissement rapide, une diarrhée. Ces signes sont réversibles à la diminution ou à l'arrêt du traitement.

Contactez votre médecin qui adaptera les doses.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

##### Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: [www.ansm.sante.fr](http://www.ansm.sante.fr)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

#### 5. COMMENT CONSERVER TEATROIS 0,35 mg, comprimé ?

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

##### Date de péremption

Ne pas utiliser TEATROIS 0,35 mg, comprimé après la date de péremption mentionnée sur la boîte.

La date de péremption figurant sur l'emballage et sur chaque plaquette alvéolée contenant les comprimés indique la date à partir de laquelle il ne faut plus utiliser ce médicament.

##### Conditions de conservation

Pas de précautions particulières de conservation.

*Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration*

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

#### 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

##### Liste complète des substances actives et des excipients

##### Que contient TEATROIS 0,35 mg, comprimé ?

##### La substance active est:

Tiratricol ..... 0,35 mg

Pour un comprimé.

##### Les autres composants sont:

Hydrogénophosphate de calcium, amidon de maïs, lactose monohydraté, stéarate de magnésium.

##### Forme pharmaceutique et contenu

##### Qu'est-ce que TEATROIS 0,35 mg, comprimé et contenu de l'emballage extérieur ?

Ce médicament se présente sous forme de comprimé. Boîte de 100 comprimés.

##### Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent

##### Titulaire

**LABORATOIRES THERANOL DEGLAUDE**

72 RUE DU FAUBOURG SAINT HONORE

75008 PARIS

##### Exploitant

**D.B. PHARMA**

1 BIS RUE DU COMMANDANT RIVIERE

94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

**Fabricant**

**OSNY PHARMA SAS**

17, RUE DE PONTOISE

95520 OSNY

[Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen](#)

Sans objet.

[Date d'approbation de la notice](#)

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 07/12/2015.**

[AMM sous circonstances exceptionnelles](#)

Sans objet.

[Informations Internet](#)

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'ANSM (France).

[Informations réservées aux professionnels de santé](#)

Sans objet.

[Autres](#)

Sans objet.